



Dierenartsenpraktijk Akoot

Leuvensesteenweg 355
3070 Kortenberg
0475/581.563
www.akuut.be
info@akuut.be

CASTRATIE KATER

Wat?

Castratie is een chirurgische ingreep bij de kater waarbij de teelballen of testikels worden weggenomen. De testikels bestaan uit een bal en een bijbal. Deze produceren hormonen specifiek voor het mannelijk dier en hebben invloed op het gedrag en vruchtbaarheid van de kater.

Waarom een kater castreren?

Een kater kan om persoonlijke of medische redenen worden gecastreerd.

Persoonlijke redenen zijn:

- * Minder proberen weg te lopen : Na castratie is de kans dat de kater opzoek gaat naar een katin minder groot.
- * Een niet-gecastreerde kater zal sproeigedrag vertonen voor zijn territorium af te bakenen. Een gecastreerde kater zal dit gedrag minder vertonen. Wanneer de kater al sproeit voor de castratie, bestaat er een kans dat hij dit gedrag zal blijven vertonen, ondanks het uitvoeren van de castratie.
- * Ongewenste dekking en dracht van een niet-gesteriliseerde katin, al dan niet van hetzelfde gezin, wordt voorkomen door castratie.

Medische redenen:

- * Bij correctie van een perianaalbreuk wordt er eveneens meestal een castratie uitgevoerd.
- * Op een leeftijd van 6 maanden moeten bij de katers de beide testikels ingedaald zijn in de balzak, gelokaliseerd net onder de anus van de kater. Op deze leeftijd zal het lieskanaal sluiten en kunnen de testikels niet meer in de buik getrokken worden. Bij het achterblijven van een testikel in de buik moet de kater gecastreerd worden. Dit heeft 2 redenen: ten eerste deze aandoening is erfelijk en ten tweede een achtergebleven testikel kan zich gaan uiten als tumor. Deze zijn bij katten zeer agressief en kwaadaardig, dus daarmee dat we aanraden om een cryptorche kater te castreren. Hierbij wordt zowel de afgedaalde testikel als niet-afgedaalde testikel verwijderd.

Zijn er alternatieven voor castratie?

Chemische castratie wordt minder bij katers uitgevoerd.

Heeft castratie ook nadelen?

Castratie heeft enkele nadelen.

- * De katers kunnen toenemen in gewicht, met overgewicht of obesitas als gevolg. Hiervan hebben

veel gecastreerde katers last. De dagelijkse energie van een gecastreerde kater is lager dan deze van een niet-gecastreerde kater, namelijk respectievelijk 24% en 30%. Overgewicht kan men behandelen door het geven van een dieetvoeding of door minder van het oorspronkelijke eten te geven, dus eigenlijk heeft de eigenaar hier een belangrijke invloed op.

* Castratie is een operatie en wordt uitgevoerd onder volledige verdoving. Zoals iedereen weet is er aan elke verdoving een bepaald risico.

Behandeling

Vorbereiding

Voor een operatie wordt de kater best 's morgens nuchter binnengebracht. Het eten wordt best om middernacht de dag voor de operatie weggenomen, zodat hij minstens 8u niet meer heeft gegeten. Drankopname is toegestaan tot ongeveer 1u voor de operatie. Sommige geneesmiddelen die worden toegediend om de kater onder narcose te brengen hebben als nevenverschijnsel braken. Wanneer de kater zou gegeten of gedronken hebben, bestaat de kans op een ontsteking van de luchtwegen bij inademing van het eventueel uitgebraakte voedsel. Na een algemeen onderzoek wordt de kater met een injectie verdoofd in uw bijzijn. Voor de operatie krijgt de kater pijnstillers en antibiotica toegediend.

De operatie

Eenmaal de kater goed onder narcose is, wordt de haren op de balzak verwijderd en ontsmet. Er wordt een insnede van 1 cm op elke balzak gemaakt en de testikels worden opgezocht en verwijderd. Via een bepaalde chirurgische knoop worden de bloedvaten en zaadleiters afgebonden. De 2 insnedes blijven open en de huid wordt er dus niet gehecht.

Recovery

De kater zal na de operatie naar de recovery-ruimte worden overgebracht, waartoe hij rustig kan wakker worden en er een lamp is voorzien om zijn temperatuur op peil te houden. Eenmaal wanneer hij goed wakker is, krijgt hij de mogelijkheid om te drinken. Vanaf dat moment is het mogelijk om uw kater te komen ophalen.

Nazorg

Normaal gezien is het niet nodig nog medicatie te geven wanneer de kater weer thuis is. De avond van de operatie mag men de kater een kleine hoeveelheid eten geven, en de volgende dag mag de routine betreffende de voeding weer aanvatten. Bij enige twijfel of bezorgdheid mag U ons altijd contacteren.

Wat betreft de voeding?

De kans op zwaarlijvigheid is bij gesteriliseerde katten (castratie en sterilisatie) 2x hoger dan bij een doorsnee kattenpopulatie. Studies tonen aan dat bij gecastreerde katers die gedurende 16 weken kunnen eten wanneer ze willen het gewicht 22% toeneemt.

Dit kan u zelf onder controle houden:

Indien deze katers een voeding krijgen die 30% minder calorieën bevat, dan behouden ze hun ideale gewicht. Overgewicht bij katten heeft veel nadelen: kortere levensverwachting, meer arthroseproblemen, hart en ademhalingsproblemen, meer kans op diabetes, verminderde immuniteit, meer risico bij een operatie en/of verdoving,... Het is dus enorm belangrijk de voeding aan te passen, indien nodig, om overgewicht te vermijden.

Aarzel niet om ons om raad te vragen.